

# 予防接種スケジュール

ベストのタイミングで受けるために

## 小学生の百日せきが増えています。

### 年長さんは三種混合ワクチンで 予防しましょう。




おにいちゃん・  
おねえちゃんが  
赤ちゃんを  
まもるつ!




※三種混合ワクチン(任意接種)は  
MRワクチン2期などと同時接種ができます。

0歳・1歳で四種混合(三種混合)ワクチンを受けていても、5歳ごろには百日せきにかかりやすくなっています。お子さんと赤ちゃんを守るために、小学校入学前に三種混合ワクチンを受けましょう。

#### 百日せきの免疫力



#### 百日せきの罹患率



## KNOW★VPD!

VPDを知って、子どもを守ろう。

### ワクチンで子どもを VPD から守りましょう

VPDとは「ワクチンで防げる病気」のことです。

<http://www.know-vpd.jp/>



赤ちゃんを守る! 入学前の三種混合

<http://www.know-vpd.jp/>

VPD

検索

# 予防接種スケジュール

大切な子どもをVPD(ワクチンで防げる病気)から守るためには、接種できる時期になったらできるだけベストのタイミングで、忘れずに予防接種を受けることが重要です。このスケジュールはNPO法人 VPDを知って、子どもを守ろうの会によるもっとも早期に免疫をつけるための提案です。お子さまの予防接種に関しては、地域ごとの接種方法やVPDの流行状況に応じて、かかりつけ医と相談のうえスケジュールを立てましょう。

ワクチン名	接種済み <input checked="" type="checkbox"/>	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	(満年齢)
<b>不活化ワクチン</b> B型肝炎 (母子感染予防を除く) <b>定期</b>	<input type="checkbox"/>		①→②		③											
<b>生ワクチン</b> ロタウイルス <b>任意</b>	<input type="checkbox"/>		①→②	③												
<b>不活化ワクチン</b> ヒブ <b>定期</b>	<input type="checkbox"/>		①→②→③													
<b>不活化ワクチン</b> 小児用肺炎球菌 <b>定期</b>	<input type="checkbox"/>		①→②→③													
<b>不活化ワクチン</b> 四種混合 (DPT-IPV) 三種混合・ポリオ <b>定期</b>	<input type="checkbox"/>		①→②→③													
<b>生ワクチン</b> BCG <b>定期</b>	<input type="checkbox"/>		①													
<b>生ワクチン</b> MR (麻しん風しん混合) <b>定期</b>	<input type="checkbox"/>															
<b>生ワクチン</b> 水痘 (みずぼうそう) <b>定期</b>	<input type="checkbox"/>															
<b>生ワクチン</b> おたふくかぜ <b>任意</b>	<input type="checkbox"/>															
<b>不活化ワクチン</b> 日本脳炎 <b>定期</b>	<input type="checkbox"/>															
<b>不活化ワクチン</b> インフルエンザ <b>任意</b>	毎秋															
<b>不活化ワクチン</b> A型肝炎 <b>任意</b>	<input type="checkbox"/>															
<b>不活化ワクチン</b> HPV (ヒトパピローマウイルス) <b>定期</b>	<input type="checkbox"/>															
<b>不活化ワクチン</b> 髄膜炎菌 <b>任意</b>	<input type="checkbox"/>															

不活化ワクチン 不活化ワクチン 定期 定められた期間内で受ける場合は原則として無料(公費負担)。 定期予防接種の対象年齢 ↔ おすすめ接種時期(数字は接種回数) ↔○↔ 添付文書に記載のないおすすめ接種時期  
生ワクチン 生ワクチン 任意 多くは有料(自己負担)。自治体によっては公費助成があります。任意接種ワクチンの必要性は定期接種ワクチンと変わりません。 任意接種の接種できる年齢 ●次にほかの種類のワクチンが接種できるのは、不活化ワクチン接種後は1週間後の同じ曜日から、生ワクチン接種後は4週間後の同じ曜日からです。  
同時接種: 同時に複数のワクチンを接種することができます。安全性は単独でワクチンを接種した場合と変わりません。 (\*) 添付文書に記載はないが、接種を推奨

同時接種: 同時に複数のワクチンを接種することができます。安全性は単独でワクチンを接種した場合と変わりません。 国や日本小児科学会も乳幼児の接種部位として太もも(大腿前外側部)も推奨しています。詳しくはかかりつけ医にご相談ください。 **詳しい情報は <http://www.know-vpd.jp/>** VPD 検索