

レンビマ副作用チェックシート

年 月 日

入院・外来 () ID () 氏名 ()

●高血圧

_____ / _____ mmHg

●下痢

通常 _____ 回/日、現在 _____ 回/日

●疲労感・倦怠感

- 以前より朝起きづらい。
 疲れやすい、だるい、体が重い
 以前より仕事や家事が辛い。

●食欲不振

- 食事量の変化 ()
 体重変化 _____ kg減少

●手足症候群

- 赤み 手 足
 皮膚の剥がれ 手 足
 痛み 手 足

●蛋白尿

- 足のむくみ
 尿が泡立ち



●甲状腺機能低下症

- 寒気を感じる
 声のかすれ
 いつも眠たい、疲れやすい

●出血

- ぶつけた覚えのないアザ
 鼻血や歯茎からの出血。

●肝性脳症

- 昼夜リズムが逆転
 時間・場所が分からなくなる
 日中にうとうとする

●残薬確認

- レンビマ ()
 チラージン ()
 降圧剤 ()

高血圧	収縮期血圧 < 140mmHg かつ 拡張期血圧 < 90mmHg	収縮期血圧 ≥ 140mmHg 又は 拡張期血圧 ≥ 90mmHg	収縮期血圧 ≥ 160mmHg 又は 拡張期血圧 ≥ 100mmHg	収縮期血圧 ≥ 180mmHg 又は 拡張期血圧 ≥ 110mmHg
	同量継続	同量継続・降圧剤投与	休薬・降圧剤治療	投与中止

下痢	G 1 ; 4回/日の排便回数の増加	G 2 ; 4-6回/日の排便回数の増加	G 3 ; 7回/日以上排便回数の増加	G 4 ; 生命を脅かす・緊急処置必要
	同量継続	1段階減量・投与継続	休薬	投与中止

倦怠感	だるさ・元気がない	だるさ・元気がない 身の回り以外の日常生活動作の制限	だるさ・元気がない 身の回りの日常生活動作の制限	
	同量継続	1段階減量	休薬→G1に改善後減量再開	

手足症候群	痛みを伴わない皮膚の変化	痛みを伴う皮膚の変化 身の回り以外の日常生活動作の制限	痛みを伴う高度の皮膚の変化 身の回りの日常生活動作の制限	
	投与継続、保湿剤(予防) Strongステロイド	投与継続、保湿剤 Very strongステロイド	休薬→G1に改善後減量再開	

レンビマ副作用チェックシート

年 月 日

入院・外来 ID () 氏名 ()

●血圧

_____ / _____ mmHg

●食事摂取量について

食事量の変化はありましたか？

はい () いいえ

体重変化のへんかはありましたか？

_____ kg減少 _____ kg増加

●便の状態

レンビマ開始前 1日 回

現在 1日 回

●皮膚症状

赤み 手 足

皮膚の剥がれ 手 足

痛み 手 足

●疲労感・倦怠感

以前より朝起きづらい

疲れやすい、だるい、体が重く感じる

日中の眠気が強い

以前より仕事や家事が辛い

●尿の状態

足のむくみやすくなった

尿が泡立つようになった

●出血のしやすさ

ぶつけた覚えのないアザがある

鼻血や歯茎からの出血がある

●その他

寒気を感じるようになった

声がかすれやすくなった

昼夜リズムが逆転している

時間・場所が分からなくなる

●残薬確認

レンビマ ()

チラーヂン ()

降圧剤 ()

●気になる事があれば記入してください

