呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CBDCA+VNR(2W1R)+Rad　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 点滴抗癌剤 | (癌)(毒)ロゼウス注 | 20mg/m2 | 21mg/m2 |
| 04 | 点滴抗癌剤 | (癌)カルボプラチンNK注 | 2.5(AUC) | 2.7(AUC) |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩注射液 (0.3mg)2mL 「EMEC」<br>療法名:呼 非小細胞CBDCA+VNR(2W1R)+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0.5V<br>1A | 【１番目】 | | | | | | | 【１番目】 | |
| 02 | 点滴抗癌剤 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>(癌)(毒)ロゼウス注<br>療法名:呼 非小細胞CBDCA+VNR(2W1R)+Rad<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | 【２番目】 | | | | | | | 【２番目】 | |
| 03 | 点滴 | ソルデム３A輸液【200ml】<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>療法名:呼 非小細胞CBDCA+VNR(2W1R)+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 20分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0.5V | 【３番目】 | | | | | | | 【３番目】 | |
| 04 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖液250ml<br>(癌)カルボプラチンNK注<br>療法名:呼 非小細胞CBDCA+VNR(2W1R)+Rad<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | 【４番目】 | | | | | | | 【４番目】 | |
| 05 | 点滴 | 5%糖液キットH 50mL<br>療法名:呼 非小細胞CBDCA+VNR(2W1R)+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 10分で<br>投与経路:主管より | 1本 | 【５番目】 | | | | | | | 【５番目】 | |