呼内　**レジメン名称** : 呼 小細胞PTX 6W2R　**インターバル日数** : 54 日 **基準日** : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 点滴抗癌剤 | (癌)パクリタキセルＮＫ | 80mg/m2 | 84mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>ポララミン注(5mg)1mL<br>ファモチジン注用20mg「トーワ」<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>1V<br>1A<br>1A | 【１番目】 | | | | | | | 【１番目】 | |
| 02 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より | 1本 | 【２番目】 | | | | | | | 【２番目】 | |
| 03 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖液250ml<br>(癌)パクリタキセルＮＫ<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | 【３番目】 | | | | | | | 【３番目】 | |
| 04 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 10分で<br>投与経路:主管より | 1本 | 【４番目】 | | | | | | | 【４番目】 | |
| | ＜次ページあり＞ | | | | | | | | | | | |

呼内　**レジメン名称**：呼 小細胞PTX 6W2R　**インターバル日数**：54 日 **基準日**：Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>ポララミン注(5mg)1mL<br>ファモチジン注用20mg「トーワ」<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>1V<br>1A<br>1A | | | | | | 【１番目】 | | | |
| 02 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より | 1本 | | | | | | 【２番目】 | | | |
| 03 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖液250ml<br>(癌)パクリタキセルＮＫ<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | | | | | | 【３番目】 | | | |
| 04 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 10分で<br>投与経路:主管より | 1本 | | | | | | 【４番目】 | | | |
| | ＜次ページあり＞ | | | | | | | | | | | |

呼内　**レジメン名称**：呼 小細胞PTX 6W2R　**インターバル日数**：54 日 **基準日**：Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>ポララミン注(5mg)1mL<br>ファモチジン注用20mg「トーワ」<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>1V<br>1A<br>1A | | | | 【１番目】 | | | | | |
| 02 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より | 1本 | | | | 【２番目】 | | | | | |
| 03 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖液250ml<br>(癌)パクリタキセルＮＫ<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | | | | 【３番目】 | | | | | |
| 04 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 10分で<br>投与経路:主管より | 1本 | | | | 【４番目】 | | | | | |
| | ＜次ページあり＞ | | | | | | | | | | | |

呼内　**レジメン名称**：呼 小細胞PTX 6W2R　**インターバル日数**：54 日 **基準日**：Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day28 | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | Day33 | Day34 | Day35 | Day36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>ポララミン注(5mg)1mL<br>ファモチジン注用20mg「トーワ」<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>1V<br>1A<br>1A | | 【１番目】 | | | | | | | 【１番目】 |
| 02 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より | 1本 | | 【２番目】 | | | | | | | 【２番目】 |
| 03 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖液250ml<br>(癌)パクリタキセルＮＫ<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | | 【３番目】 | | | | | | | 【３番目】 |
| 04 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>療法名:呼 小細胞PTX 6W2R<br>点滴:<br>＊点滴時間 10分で<br>投与経路:主管より | 1本 | | 【４番目】 | | | | | | | 【４番目】 |