呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CDDPshort+PEM(q3W)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 点滴抗癌剤 | (癌)アリムタ注 | 500mg/m2 | 525mg/m2 |
| 05 | 点滴抗癌剤 | (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 | 75mg/m2 | 90mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>アロキシ注0.75mg<br>療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM(q3W)<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>1.5V<br>1A | 【１番目】 | | | | | | | | |
| 02 | 点滴抗癌剤 | 大塚生食注2ポート100mL<br>(癌)アリムタ注<br>療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM(q3W)<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 10分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | 【２番目】 | | | | | | | | |
| 03 | 点滴 | ソルデム３A輸液500ml<br>硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml<br>療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM(q3W)<br>点滴:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>1本 | 【３番目】 | | | | | | | | |
| 04 | 点滴 | 20%マンニットール注射液 300mL<br>療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM(q3W)<br>点滴:<br>＊点滴時間 35分で<br>投与経路:主管より | 1本 | 【４番目】 | | | | | | | | |
| 05 | 点滴抗癌剤 | 大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ<br>(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」<br>療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM(q3W)<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 400ml<br>0mg | 【５番目】 | | | | | | | | |
| 06 | 点滴<br>＜次ページあり＞ | ソルデム３A輸液500ml<br>療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM(q3W) | 1本 | 【６番目】 | | | | | | | | |

呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CDDPshort+PEM(q3W)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 点滴:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | | | | | | | | | | |