呼内　**レジメン名称**：■呼 非小細胞DOC+Ram q3W 1st,2nd　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)サイラムザ点滴静注液	10mg/kg	10.5mg/kg
05	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」	60mg/m2	79mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1									
01	点滴	ポララミン注(5mg)1mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:■呼 非小細胞DOC+Ram q3W 1st,2nd 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1A 0.5V 1本	【１番目】									
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:■呼 非小細胞DOC+Ram q3W 1st,2nd 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【２番目】									
03	点滴抗癌剤	(癌)サイラムザ点滴静注液 生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) 療法名:■呼 非小細胞DOC+Ram q3W 1st,2nd 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【３番目】									
04	点滴	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) 療法名:■呼 非小細胞DOC+Ram q3W 1st,2nd 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】									
05	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」 5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ 療法名:■呼 非小細胞DOC+Ram q3W 1st,2nd 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【５番目】									
06	点滴 ＜次ページあり＞	デキサート注射液(6.6mg)2mL 5%大塚糖液250ml 療法名:■呼 非小細胞DOC+Ram q3W 1st,2nd	0.5V 1本	【６番目】									

呼内　**レジメン名称**：■呼 非小細胞DOC+Ram q3W 1st,2nd　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より										