

## 使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)カルセド注射用	40mg/m2	48mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3						
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ラモトロン塩酸塩注射液 (0.3mg)2mL 「EMEC」 療法名:呼 非小細胞AMR q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A	【1番目】	【1番目】	【1番目】						
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞AMR q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【2番目】	【2番目】	【2番目】						
03	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌)カルセド注射用 療法名:呼 非小細胞AMR q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【3番目】	【3番目】	【3番目】						
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞AMR q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【4番目】	【4番目】	【4番目】						