

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)ゲムシタピン点滴静注「ヤルト」	1000mg/m2	1200mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5 (AUC)	6.3 (AUC)
07	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン	15mg/kg	18mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8
01	点滴	グラセトン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q3W)+GEM (2W1R)+Bev (q3W) 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1袋 1V	【1番目】							
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q3W)+GEM (2W1R)+Bev (q3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V								【1番目】
03	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ゲムシタピン点滴静注「ヤルト」 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q3W)+GEM (2W1R)+Bev (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】							【2番目】
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q3W)+GEM (2W1R)+Bev (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【3番目】							
05	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q3W)+GEM (2W1R)+Bev (q3W) 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【4番目】							
06	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q3W)+GEM (2W1R)+Bev (q3W)	1本	【5番目】							

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
		点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より										
07	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q3W)+GEM (2W1R)+Bev (q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【6番目】								
08	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q3W)+GEM (2W1R)+Bev (q3W) 点滴: *点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本	【7番目】								
09	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q3W)+GEM (2W1R)+Bev (q3W) 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本								【3番目】	