呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CBDCA+PEM+Pembro q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)キイトルーダ点滴静注　(100mg)4mL	200mg	200mg
05	点滴抗癌剤	(癌)アリムタ注	500mg/m2	525mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5(AUC)	5.3(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Pembro q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)キイトルーダ点滴静注　(100mg)4mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Pembro q3W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Pembro q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1袋 1V	【４番目】								
05	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アリムタ注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【５番目】								
06	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Pembro q3W	1本 0mg	【６番目】								

呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CBDCA+PEM+Pembro q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
07	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Pembro q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【７番目】								