呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CBDCA(q4W)+GEM(2W2R)+Erl　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)ゲムシタビン点滴静注「ﾔｸﾙﾄ」	1250mg/m2	1312mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5(AUC)	5.25(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q4W)+GEM(2W2R)+Erl 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A	【１番目】								
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q4W)+GEM(2W2R)+Erl 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V								【１番目】	
03	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ゲムシタビン点滴静注「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q4W)+GEM(2W2R)+Erl 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】							【２番目】	
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q4W)+GEM(2W2R)+Erl 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【３番目】								
05	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q4W)+GEM(2W2R)+Erl 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】								
06	点滴 ＜次ページあり＞	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA(q4W)+GEM(2W2R)+Erl	1本								【３番目】	

呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CBDCA(q4W)+GEM(2W2R)+Er1　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
		点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より										