





RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液 (6.6mg) 2mL ポララミン注 (5mg) 1mL ファモチジン注用20mg 「トーワ」 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q4W)+PTX (3W1R) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V 1A 1A						【1番目】			
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL ラモトロン塩酸塩注射液 (0.3mg) 2mL 「EMEC」 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q4W)+PTX (3W1R) 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1A									
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q4W)+PTX (3W1R) 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本						【2番目】			
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルNK 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q4W)+PTX (3W1R) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【3番目】			
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q4W)+PTX (3W1R) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
06	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q4W)+PTX (3W1R) 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本									
07	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA (q4W)+PTX (3W1R)	1本						【4番目】			

