呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CBDCA+PEM+Gef q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)アリムタ注	500mg/m2	525mg/m2
03	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5(AUC)	6.3(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Gef q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1V 1A 1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アリムタ注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Gef q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Gef q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【３番目】								
04	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PEM+Gef q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】								