呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞GEM+VNR 2W1R　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ゲムシタビン点滴静注「ﾔｸﾙﾄ」	1000mg/m2	1200mg/m2
03	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ロゼウス注	25mg/m2	30mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 非小細胞GEM+VNR 2W1R 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【１番目】							【１番目】	
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ゲムシタビン点滴静注「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:呼 非小細胞GEM+VNR 2W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】							【２番目】	
03	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)(毒)ロゼウス注 療法名:呼 非小細胞GEM+VNR 2W1R 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【３番目】							【３番目】	
04	点滴	ソルデム３A輸液【200ml】 デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 非小細胞GEM+VNR 2W1R 点滴: ＊点滴時間 20分で 投与経路:主管より	1本 0.5V	【４番目】							【４番目】	