呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CDDPshort+PEM+Bev(q3W)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)アリムタ注	500mg/m2	525mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	75mg/m2	79mg/m2
08	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン	7.5mg/kg	15.8mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg 療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM+Bev(q3W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1.5V 1A	【１番目】									
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アリムタ注 療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM+Bev(q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】									
03	点滴	ソルデム３A輸液500ml 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM+Bev(q3W) 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1本	【３番目】									
04	点滴	20%マンニットール注射液 300mL 療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM+Bev(q3W) 点滴: ＊点滴時間 35分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】									
05	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM+Bev(q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	400ml 0mg	【５番目】									
06	点滴 ＜次ページあり＞	ソルデム３A輸液500ml	1本	【６番目】									

呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CDDPshort+PEM+Bev(q3W)　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM+Bev(q3W) 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM+Bev(q3W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【７番目】								
08	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM+Bev(q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【８番目】								
09	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CDDPshort+PEM+Bev(q3W) 点滴: ＊点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本	【９番目】								