呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CBDCA+PTX(q3W)+Erl　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 点滴抗癌剤 | (癌)パクリタキセルＮＫ | 200mg/m2 | 210mg/m2 |
| 04 | 点滴抗癌剤 | (癌)カルボプラチンNK注 | 6(AUC) | 6.3(AUC) |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>ポララミン注(5mg)1mL<br>ファモチジン注用20mg「トーワ」<br>療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX(q3W)+Erl<br>点滴:<br>＊点滴時間 10分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>3V<br>1A<br>1A | 【１番目】 | | | | | | | | |
| 02 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL<br>アロキシ注0.75mg<br>療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX(q3W)+Erl<br>点滴:<br>＊点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>1A | 【２番目】 | | | | | | | | |
| 03 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ<br>(癌)パクリタキセルＮＫ<br>療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX(q3W)+Erl<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 180分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | 【３番目】 | | | | | | | | |
| 04 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖液250ml<br>(癌)カルボプラチンNK注<br>療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX(q3W)+Erl<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | 【４番目】 | | | | | | | | |
| 05 | 点滴 | 5%糖液キットH 50mL<br>療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX(q3W)+Erl<br>点滴:<br>＊点滴時間 10分で<br>投与経路:主管より | 1本 | 【５番目】 | | | | | | | | |