

## 使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)(毒)アブラキサン注100mg	40mg/m2	42mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	2(AUC)	2.1(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキン注0.75mg 生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+nabPTX (Weekly)+Rad 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1V 1A 1本	【1番目】							【1番目】	
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+nabPTX (Weekly)+Rad 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【2番目】							【2番目】	
03	点滴抗癌剤	(癌)(毒)アブラキサン注100mg 大塚生食注2ポート100mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+nabPTX (Weekly)+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【3番目】							【3番目】	
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+nabPTX (Weekly)+Rad 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【4番目】							【4番目】	
05	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注 5%大塚糖液250ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+nabPTX (Weekly)+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【5番目】							【5番目】	
06	点滴  <次ページあり>	5%糖液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+nabPTX (Weekly)+Rad 点滴:	1本	【6番目】							【6番目】	









RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day37	Day38	Day39	Day40	Day41	Day42	Day43		
01	点滴	デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキン注0.75mg 生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+nabPTX (Weekly)+Rad 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1V 1A 1本							【1番目】		
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+nabPTX (Weekly)+Rad 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本							【2番目】		
03	点滴抗癌剤	(癌)(毒)アブラキサン注100mg 大塚生食注2ポート100mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+nabPTX (Weekly)+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	0mg 1本							【3番目】		
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+nabPTX (Weekly)+Rad 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本							【4番目】		
05	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注 5%大塚糖液250ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+nabPTX (Weekly)+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本							【5番目】		
06	点滴	5%糖液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+nabPTX (Weekly)+Rad 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本							【6番目】		