

## 使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL	200mg	200mg
07	点滴抗癌剤	(癌)(毒)アブラキサン注100mg	100mg/m2	105mg/m2
09	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	6(AUC)	6.3(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【1番目】								
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】								
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】								
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml アロキシン注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V	【4番目】								
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V								【1番目】	
06	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W	1本	【5番目】							【2番目】	



RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液キトH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg)4mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
03	点滴	生食溶解液キトH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴	生食溶解液キトH 50ml アロキン注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V									
05	点滴	生食溶解液キトH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V							【1番目】		
06	点滴	生食溶解液キトH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本							【2番目】		
07	点滴抗癌剤  <次ページあり>	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アブラキサン注100mg 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】:	1本 0mg							【3番目】		

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
		*点滴時間 30分で 投与経路:主管より										
08	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本									
09	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
10	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本									
11	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+w-nabPTX+Pembro q3W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本							【4番目】		