呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CBDCA+PTX+Bev+Atezo q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)テセントリク点滴静注(1200mg)20ml	1200mg	1200mg
04	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン	15mg/kg	18mg/kg
08	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルＮＫ	175mg/m2	210mg/m2
09	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	6(AUC)	7(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+Bev+Atezo q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) (癌)テセントリク点滴静注(1200mg)20ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+Bev+Atezo q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+Bev+Atezo q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+Bev+Atezo q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+Bev+Atezo q3W 点滴: ＊点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								
06	点滴 ＜次ページあり＞	大塚生食注2ポート100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL	1本 3V 1A	【６番目】								

呼内　**レジメン名称**：呼 非小細胞CBDCA+PTX+Bev+Atezo q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		ファモチジン注用20mg「トーワ」 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+Bev+Atezo q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1A									
07	点滴	大塚生食注2ポート100mL アロキシ注0.75mg 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+Bev+Atezo q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 1A	【７番目】								
08	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)パクリタキセルＮＫ 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+Bev+Atezo q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 180分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【８番目】								
09	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+Bev+Atezo q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【９番目】								
10	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:呼 非小細胞CBDCA+PTX+Bev+Atezo q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	１０番目								