

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ハラヴェン注(1mg)2ml	1.4mg/m2	1.68mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	6mg/kg	7.2mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(q3W) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【1番目】							【1番目】
02	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌)(毒)ハラヴェン注(1mg)2ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(q3W) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】							【2番目】
03	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(q3W) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】							
04	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(q3W) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【4番目】							
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(q3W) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本								【3番目】
06	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(q3W) 2~ 点滴:	1本	【5番目】							

