乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺Eribulin+HCPT q2W 1st　**インターバル日数**：12 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ハラヴェン注(1mg)2ml	1.4mg/m2	1.68mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	6mg/kg	7.2mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺Eribulin+HCPT q2W 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)(毒)ハラヴェン注(1mg)2ml 療法名:乳 乳腺Eribulin+HCPT q2W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin+HCPT q2W 1st 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺Eribulin+HCPT q2W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin+HCPT q2W 1st 点滴: ＊点滴時間 20分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								