耳鼻　**レジメン名称**：耳 頭頸部 PTX+Cet Weekly 1st　**インターバル日数**：5 日　**基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 点滴抗癌剤 | (癌)パクリタキセルＮＫ | 80mg/m2 | 84mg/m2 |
| 06 | 点滴抗癌剤 | (癌)アービタックス注(100mg)20ml | 400mg/m2 | 480mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>ポララミン注(5mg)1mL<br>ファモチジン注用20mg「トーワ」<br>療法名:耳 頭頸部 PTX+Cet Weekly 1st<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>1V<br>1A<br>1A | 【１番目】 | | | | | | | | |
| 02 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL<br>療法名:耳 頭頸部 PTX+Cet Weekly 1st<br>点滴:<br>＊点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より | 1本 | 【２番目】 | | | | | | | | |
| 03 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖液250ml<br>(癌)パクリタキセルＮＫ<br>療法名:耳 頭頸部 PTX+Cet Weekly 1st<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | 【３番目】 | | | | | | | | |
| 04 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>療法名:耳 頭頸部 PTX+Cet Weekly 1st<br>点滴:<br>＊点滴時間 10分で<br>投与経路:主管より | 1本 | 【４番目】 | | | | | | | | |
| 05 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>療法名:耳 頭頸部 PTX+Cet Weekly 1st<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:側管より | 1本 | 【５番目】 | | | | | | | | |
| 06 | 点滴抗癌剤<br>＜次ページあり＞ | 大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ<br>(癌)アービタックス注(100mg)20ml<br>療法名:耳 頭頸部 PTX+Cet Weekly 1st | 1袋<br>0mg | 【６番目】 | | | | | | | | |

**耳鼻**　**レジメン名称**：耳 頭頸部 PTX+Cet Weekly 1st　**インターバル日数**：5 日　**基準日**：Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 120分で<br>投与経路:側管より | | | | | | | | | | |
| 07 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL<br>療法名:耳 頭頸部 PTX+Cet Weekly 1st<br>点滴:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:側管より | 1本 | 【７番目】 | | | | | | | | |