脳外　**レジメン名称**：脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン	10mg/kg	12mg/kg
05	点滴抗癌剤	(癌)テモダール注100mg	75mg/m2	90mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ3mg/100mL 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1袋	【３番目】								
04	点滴	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ3mg/100mL 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1袋		【１番目】	【１番目】	【１番目】	【１番目】				
05	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) (癌)テモダール注100mg 注射用水20ml 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg 4A	【４番目】	【２番目】	【２番目】	【２番目】	【２番目】				
06	点滴 ＜次ページあり＞	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴: ＊点滴時間 45分で	1本									

脳外　**レジメン名称**：脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
		投与経路:主管より										
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】	【３番目】	【３番目】	【３番目】	【３番目】				
	＜次ページあり＞											

脳外　**レジメン名称**：脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【１番目】			
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【２番目】			
03	点滴	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ3mg/100mL 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1袋									
04	点滴	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ3mg/100mL 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1袋									
05	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) (癌)テモダール注100mg 注射用水20ml 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg 4A									
06	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴: ＊点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本						【３番目】			
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:脳 神経膠腫 TMZ(1-5) +Bev q2W+Rad 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本									