皮膚　　**レジメン名称** : 皮 黒色腫 NIVO+IPI q3W　　**インターバル日数** : 19 日 **基準日** : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)オプジーボ点滴静注	80mg	80mg
04	点滴抗癌剤	(癌)ヤーボイ点滴静注液(50mg)10mL	3mg/kg	3.6mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:皮 黒色腫 NIVO+IPI q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)オプジーボ点滴静注 療法名:皮 黒色腫 NIVO+IPI q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:皮 黒色腫 NIVO+IPI q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ヤーボイ点滴静注液(50mg)10mL 療法名:皮 黒色腫 NIVO+IPI q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	90ml 0mg	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:皮 黒色腫 NIVO+IPI q3W 点滴: ＊点滴時間 50分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								