産婦　**レジメン名称**：婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W)　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン	10mg/kg	12mg/kg
05	点滴抗癌剤	(癌)ドキシル注 (20mg)10ml	40mg/m2	42mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W) 点滴: ＊点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴	5%糖液キットH 50mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【４番目】								
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)ドキシル注 (20mg)10ml 療法名:婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【５番目】								
06	点滴 ＜次ページあり＞	5%糖液キットH 50mL 療法名:婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W) 点滴: ＊点滴時間 15分で	1本	【６番目】								

産婦　**レジメン名称**：婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W)　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
		投与経路:主管より										
	＜次ページあり＞											

産婦　**レジメン名称**：婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W)　**インターバル日数**：26 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【１番目】			
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【２番目】			
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W) 点滴: ＊点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本						【３番目】			
04	点滴	5%糖液キットH 50mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V									
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)ドキシル注 (20mg)10ml 療法名:婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
06	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:婦 卵巣Doxil(q4W)+Bev(q2W) 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本									