

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
04	点滴	(癌)(毒)トセギセル点滴静注「ケミア」	70mg/m2	84mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」	70mg/m2	84mg/m2
08	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	175mg/m2	210mg/m2
09	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	350mg/m2	420mg/m2
10	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	350mg/m2	420mg/m2
11	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	350mg/m2	420mg/m2
12	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	175mg/m2	210mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6		
01	点滴	ソルデム 3A輸液500ml 療法名:消 食道(入)DOC+CDDP+ 5 FU[DCF]q3W 点滴: *点滴時間 2時間で 投与経路:主管より	1本	【1 番目】								
02	点滴	ソルラクト輸液 500mL 硫酸Mg 補正液(20mEq) 20ml 療法名:消 食道(入)DOC+CDDP+ 5 FU[DCF]q3W 点滴: *点滴時間 3時間で 投与経路:主管より	1本 1本		【1 番目】							
03	点滴	デキサート注射液(6.6mg) 2mL アロキシ注0.75mg 生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 食道(入)DOC+CDDP+ 5 FU[DCF]q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1.5V 1A 1本		【2 番目】							
04	点滴	(癌)(毒)トセギセル点滴静注「ケミア」 5%大塚糖注500mlソフトバック 療法名:消 食道(入)DOC+CDDP+ 5 FU[DCF]q3W 点滴: *点滴時間 1時間で 投与経路:主管より	0mg 1本		【3 番目】							
05	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 食道(入)DOC+CDDP+ 5 FU[DCF]q3W 点滴:	1本		【4 番目】							

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6		
12	点滴抗癌剤	ソルデム 3A輸液500ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 食道(入)DOC+CDDP+ 5 FU[DCF]q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 6時間で 投与経路:主管より	1本 0mg							【1番目】		
13	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 食道(入)DOC+CDDP+ 5 FU[DCF]q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本							【2番目】		