

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
07	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」	70mg/m2	84mg/m2
09	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	175mg/m2	210mg/m2
10	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	350mg/m2	420mg/m2
11	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	350mg/m2	420mg/m2
12	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	350mg/m2	420mg/m2
13	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	175mg/m2	210mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6		
01	点滴	ソルデム 3A輸液500ml 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴: *点滴時間 2時間で 投与経路:主管より	1本	【1 番目】								
02	点滴	ソルラクト輸液 500mL 硫酸M g 補正液 (20mEq) 20ml 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴: *点滴時間 2時間で 投与経路:主管より	1本 1本		【1 番目】							
03	点滴	ソルラクト輸液 500mL 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴: *点滴時間 2時間で 投与経路:主管より	1本		【2 番目】							
04	点滴	生食溶解液キトH 50ml 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本		【3 番目】							
05	点滴	プロイメンド注150mg 5%大塚糖液250ml 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1V 1本		【4 番目】							
06	点滴 <次ページあり>	デキサート注射液(6.6mg) 2mL	1. 5V		【5 番目】							

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6		
		アロキシン注0.75mg 生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1A 1本									
07	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバッグ (癌)シスプラチン点滴静注「マルコ」 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 2時間で 投与経路:主管より	1袋 0mg		【6番目】							
08	点滴	ソラクト輸液 500mL フロセミド注射液「日医工」(20mg)2mL 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴: *点滴時間 2時間で 投与経路:主管より	1本 1A		【7番目】							
09	点滴抗癌剤	ソルデム3A輸液500ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 6時間で 投与経路:主管より	1本 0mg		【8番目】							
10	点滴抗癌剤	ソルデム3A (1000ml) (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 12時間で 投与経路:主管より	1本 0mg		【9番目】							
11	点滴抗癌剤	ソルデム3A (1000ml) (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 12時間で 投与経路:主管より	1本 0mg			【1番目】	【1番目】	【1番目】	【1番目】			
12	点滴抗癌剤 <次ページあり>	ソルデム3A (1000ml) (癌)フルオロウラシル注	1本 0mg			【2番目】	【2番目】	【2番目】	【2番目】			

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6		
		療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 12時間で 投与経路:主管より										
13	点滴抗癌剤	ソルデム 3A輸液500ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 6時間で 投与経路:主管より	1本 0mg								【1番目】	
14	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 食道(入)CDDP+ 5FU[FP]+Proemend q3W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本								【2番目】	