

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|----|-------|------------|---------|-----------|
| 04 | 点滴抗癌剤 | (癌)ダラザレックス | 8mg/kg | 9.6mg/kg |
| 05 | 点滴抗癌剤 | (癌)ダラザレックス | 8mg/kg | 9.6mg/kg |
| 06 | 点滴抗癌剤 | (癌)ダラザレックス | 16mg/kg | 19.2mg/kg |
| 07 | 点滴抗癌剤 | (癌)ダラザレックス | 16mg/kg | 19.2mg/kg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 |
|----|-------------------|---|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 01 | 点滴 | デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より | 3V 1A 1本 | 【1番目】 | | | | | | | 【1番目】 | |
| 02 | 点滴 | アセリオ静注液(1000mg)100mLバッグ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より | 1袋 | 【2番目】 | | | | | | | 【2番目】 | |
| 03 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より | 1本 | 【3番目】 | | | | | | | 【3番目】 | |
| 04 | 点滴抗癌剤 | (癌)ダラザレックス 大塚生食注 500mL ソフトバッグ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 25mL/h 投与経路:主管より | 0mg 1袋 | 【4番目】 | | | | | | | | |
| 05 | 点滴抗癌剤 | (癌)ダラザレックス 大塚生食注 500mL ソフトバッグ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 25mL/h 投与経路:主管より | 0mg 1袋 | 【5番目】 | | | | | | | | |
| 06 | 点滴抗癌剤 <次ページあり> | (癌)ダラザレックス | 0mg | | | | | | | | 【4番目】 | |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 |
|----|-------------------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 点滴 | デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より | 3V 1A 1本 | | | | | | 【1番目】 | | | |
| 02 | 点滴 | アセリオ静注液(1000mg)100mLﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より | 1袋 | | | | | | 【2番目】 | | | |
| 03 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | | | 【3番目】 | | | |
| 04 | 点滴抗癌剤 | (癌)ダラザレックス 大塚生食注 500mL ソフトﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 25mL/h 投与経路:主管より | 0mg 1袋 | | | | | | | | | |
| 05 | 点滴抗癌剤 | (癌)ダラザレックス 大塚生食注 500mL ソフトﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 25mL/h 投与経路:主管より | 0mg 1袋 | | | | | | | | | |
| 06 | 点滴抗癌剤 | (癌)ダラザレックス 大塚生食注 500mL ソフトﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 50mL/h 投与経路:主管より | 0mg 1袋 | | | | | | | | | |
| 07 | 点滴抗癌剤 <次ページあり> | (癌)ダラザレックス 大塚生食注 500mL ソフトﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W | 0mg 1袋 | | | | | | 【4番目】 | | | |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | | | | | | |
|----|-------------------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴 | デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より | 3V 1A 1本 | | | | 【1番目】 | | | | | | |
| 02 | 点滴 | アセリオ静注液(1000mg)100mLﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より | 1袋 | | | | 【2番目】 | | | | | | |
| 03 | 点滴 | 大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | 【3番目】 | | | | | | |
| 04 | 点滴抗癌剤 | (癌)ダラザレックス 大塚生食注 500mL ソフトﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 25mL/h 投与経路:主管より | 0mg 1袋 | | | | | | | | | | |
| 05 | 点滴抗癌剤 | (癌)ダラザレックス 大塚生食注 500mL ソフトﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 25mL/h 投与経路:主管より | 0mg 1袋 | | | | | | | | | | |
| 06 | 点滴抗癌剤 | (癌)ダラザレックス 大塚生食注 500mL ソフトﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 50mL/h 投与経路:主管より | 0mg 1袋 | | | | | | | | | | |
| 07 | 点滴抗癌剤 <次ページあり> | (癌)ダラザレックス 大塚生食注 500mL ソフトﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W | 0mg 1袋 | | | | 【4番目】 | | | | | | |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | | | | | |
|----|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | | 点滴抗癌剤【薬剤部混合】： *点滴速度 100mL/h 投与経路:主管より | | | | | | | | | | |
| 08 | 点滴 | 生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 骨髓腫 DLd 1st q4W 点滴： *点滴時間 15分で 投与経路:主管より | 1本 | | | | 【5番目】 | | | | | |