

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ハラヴェン注(1mg)2ml	1. 4mg/m2	1. 68mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	2mg/kg	2. 4mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【1番目】							【1番目】	
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
03	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌)(毒)ハラヴェン注(1mg)2ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】							【2番目】	
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】							【3番目】	
05	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【4番目】							【4番目】	
06	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴:	1本	【5番目】							【5番目】	

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V									
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本							【1番目】		
03	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌)(毒)ハラヴェン注(1mg)2ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
05	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A							【2番目】		
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺Eribulin(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本							【3番目】		