

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴	(癌)プレドニン水溶性注	100mg	120mg
03	点滴	(癌)プレドニン水溶性注	100mg	120mg
05	点滴抗癌剤	(癌)ガザイバ点滴静注(1000mg)40mL	1000mg	1000mg
09	点滴抗癌剤	(癌)トレアキシ注100mg	90mg/m2	108mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	アセリオ静注液(1000mg)100mLバッグ 療法名:血 Bリンパ腫GA-Bendamustine q4W 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1袋	【1番目】							【1番目】	
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)プレドニン水溶性注 ポララミン注(5mg)1mL アロキシ注0.75mg 療法名:血 Bリンパ腫GA-Bendamustine q4W 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A 1A	【2番目】								
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)プレドニン水溶性注 ポララミン注(5mg)1mL 療法名:血 Bリンパ腫GA-Bendamustine q4W 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A								【2番目】	
04	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 Bリンパ腫GA-Bendamustine q4W 1st 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】							【3番目】	
05	点滴抗癌剤 <次ページあり>	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)ガザイバ点滴静注(1000mg)40mL 療法名:血 Bリンパ腫GA-Bendamustine q4W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 12.5mL/h	210ml 0mg	【4番目】							【4番目】	

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	アセリオ静注液(1000mg)100mLバッグ 療法名:血 Bリンパ腫GA-Bendamustine q4W 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1袋						【1番目】			
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)プレドニン水溶性注 ポララミン注(5mg)1mL アロキシン注0.75mg 療法名:血 Bリンパ腫GA-Bendamustine q4W 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A 1A									
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)プレドニン水溶性注 ポララミン注(5mg)1mL 療法名:血 Bリンパ腫GA-Bendamustine q4W 1st 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A						【2番目】			
04	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 Bリンパ腫GA-Bendamustine q4W 1st 点滴: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本						【3番目】			
05	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)ガザイバ点滴静注(1000mg)40mL 療法名:血 Bリンパ腫GA-Bendamustine q4W 1st 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴速度 12.5mL/h 投与経路:主管より	210ml 0mg						【4番目】			
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 Bリンパ腫GA-Bendamustine q4W 1st 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
07	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血 Bリンパ腫GA-Bendamustine q4W 1st	1本						【5番目】			

