産婦　**レジメン名称**：婦 体部DOC+CBDCA[DC] q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」	70mg/m2	74mg/m2
03	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	6(AUC)	6.3(AUC)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml アロキシ注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 体部DOC+CBDCA[DC] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」 療法名:婦 体部DOC+CBDCA[DC] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)カルボプラチンNK注 療法名:婦 体部DOC+CBDCA[DC] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【３番目】								
04	点滴	5%糖液キットH 50mL 療法名:婦 体部DOC+CBDCA[DC] q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】								