乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺EPI100+CPA+5FU[FEC100] q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)エピルビシンNK	100mg/m2	120mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	500mg/m2	600mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	500mg/m2	600mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg 療法名:乳 乳腺EPI100+CPA+5FU[FEC100] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1.5V 1A	【１番目】								
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺EPI100+CPA+5FU[FEC100] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)エピルビシンNK 療法名:乳 乳腺EPI100+CPA+5FU[FEC100] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)エンドキサン注射用 療法名:乳 乳腺EPI100+CPA+5FU[FEC100] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺EPI100+CPA+5FU[FEC100] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【５番目】								
06	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)フルオロウラシル注	1本 0mg	【６番目】								

乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺EPI100+CPA+5FU[FEC100] q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		療法名:乳 乳腺EPI100+CPA+5FU[FEC100] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より										
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺EPI100+CPA+5FU[FEC100] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【７番目】								