

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)ゲムシタピン点滴静注「ヤルト」	1000mg/m2	1050mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルNK	175mg/m2	184mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8
01	点滴	大塚生食注2ポート100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL ファモチジン注用20mg「トーワ」 ポララミン注(5mg)1mL 療法名:泌 尿路上皮GEM(2W1R)+PTX(q3W) 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本 3V 1A 1A	【1番目】							
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:泌 尿路上皮GEM(2W1R)+PTX(q3W) 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V								【1番目】
03	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ゲムシタピン点滴静注「ヤルト」 療法名:泌 尿路上皮GEM(2W1R)+PTX(q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】							【2番目】
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:泌 尿路上皮GEM(2W1R)+PTX(q3W) 点滴: *点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】							
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)パクリタキセルNK 療法名:泌 尿路上皮GEM(2W1R)+PTX(q3W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 180分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【4番目】							
06	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml	1本	【5番目】							

