血液　**レジメン名称**：血 Bﾘﾝﾊﾟ腫GA-CVP q3W 2~　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴	(癌)プレドニン水溶性注	100mg	120mg
04	点滴抗癌剤	(癌)ガザイバ点滴静注(1000mg)40mL	1000mg	1000mg
07	点滴抗癌剤	(癌)オンコビン注1mg	1.4mg/m2	2mg
08	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	750mg/m2	900mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	アセリオ静注液(1000mg)100mLﾊﾞｯｸﾞ 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫GA-CVP q3W 2~ 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1袋	【１番目】								
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)プレドニン水溶性注 ポララミン注(5mg)1mL 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫GA-CVP q3W 2~ 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【２番目】								
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫GA-CVP q3W 2~ 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) (癌)ガザイバ点滴静注(1000mg)40mL 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫GA-CVP q3W 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴速度 12.5mL/h 投与経路:主管より	210ml 0mg	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫GA-CVP q3W 2~ 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								
06	点滴 ＜次ページあり＞	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ3mg/100mL 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫GA-CVP q3W 2~	1袋	【６番目】								

血液　**レジメン名称**：血 Bﾘﾝﾊﾟ腫GA-CVP q3W 2~　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より										
07	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)オンコビン注1mg 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫GA-CVP q3W 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【７番目】								
08	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)エンドキサン注射用 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫GA-CVP q3W 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【８番目】								
09	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 Bﾘﾝﾊﾟ腫GA-CVP q3W 2~ 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【９番目】								