産婦　**レジメン名称**：婦 体部ADM+CDDPshort[AP] q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg	60mg/m2	63mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	50mg/m2	53mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml アロキシ注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 体部ADM+CDDPshort[AP] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1.5V	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg 療法名:婦 体部ADM+CDDPshort[AP] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 体部ADM+CDDPshort[AP] q3W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴	ソルデム３A輸液500ml 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:婦 体部ADM+CDDPshort[AP] q3W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1本	【４番目】								
05	点滴	20%マンニットール注射液 300mL 療法名:婦 体部ADM+CDDPshort[AP] q3W 点滴: ＊点滴時間 35分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】								
06	点滴抗癌剤 ＜次ページあり＞	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:婦 体部ADM+CDDPshort[AP] q3W	1袋 0mg	【６番目】								

産婦　**レジメン名称**：婦 体部ADM+CDDPshort[AP] q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より										
07	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:婦 体部ADM+CDDPshort[AP] q3W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【７番目】								