産婦　**レジメン名称**：婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)アバスチン	15mg/kg	15.8mg/kg
05	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルＮＫ	67.5mg/m2	70.9mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルＮＫ	67.5mg/m2	70.9mg/m2
10	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	50mg/m2	52mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2							
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)アバスチン 療法名:婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 90分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注用20mg「トーワ」 療法名:婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 45分で 投与経路:主管より	1本 3V 1A 1A	【３番目】								
04	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】								
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)パクリタキセルＮＫ 療法名:婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 12時間で 投与経路:主管より	1本 0mg	【５番目】								
	＜次ページあり＞											

産婦　**レジメン名称**：婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2							
06	点滴抗癌剤	５%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)パクリタキセルＮＫ 療法名:婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 12時間で 投与経路:主管より	1本 0mg	【６番目】								
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【７番目】								
08	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1本		【１番目】							
09	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml アロキシ注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本 1A 1.5V		【２番目】							
10	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1袋 0mg		【３番目】							
11	点滴 ＜次ページあり＞	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml フロセミド注射液「日医工」(20mg)2mL 療法名:婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 120分で	1本 1本 1A		【４番目】							

産婦　**レジメン名称**：婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2							
		投与経路:主管より										
12	点滴	ＫＮ1号輸液500ml ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ10ml 療法名:婦 頚部(入)CDDP+PTX+Bev q3W 点滴: ＊点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 1本		【５番目】							