消内　**レジメン名称**：消 食道DOC Weekly+Rad　**インターバル日数**：40 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 点滴抗癌剤 | (癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」 | 10mg/m2 | 12mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day8 | Day9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>療法名:消 食道DOC Weekly+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0.5V | 【１番目】 | | | | | | | 【１番目】 | |
| 02 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ<br>(癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」<br>療法名:消 食道DOC Weekly+Rad<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | 【２番目】 | | | | | | | 【２番目】 | |
| 03 | 点滴 | 5%大塚糖液250ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>療法名:消 食道DOC Weekly+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0.5V | 【３番目】 | | | | | | | 【３番目】 | |
| | ＜次ページあり＞ | | | | | | | | | | | |

消内　**レジメン名称**：消 食道DOC Weekly+Rad　**インターバル日数**：40 日 **基準日**：Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 | Day15 | Day16 | Day17 | Day18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>療法名:消 食道DOC Weekly+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0.5V | | | | | | 【１番目】 | | | |
| 02 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ<br>(癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」<br>療法名:消 食道DOC Weekly+Rad<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | | | | | | 【２番目】 | | | |
| 03 | 点滴 | 5%大塚糖液250ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>療法名:消 食道DOC Weekly+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0.5V | | | | | | 【３番目】 | | | |
| | ＜次ページあり＞ | | | | | | | | | | | |

消内　**レジメン名称**：消 食道DOC Weekly+Rad　**インターバル日数**：40 日 **基準日**：Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day19 | Day20 | Day21 | Day22 | Day23 | Day24 | Day25 | Day26 | Day27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>療法名:消 食道DOC Weekly+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0.5V | | | | 【１番目】 | | | | | |
| 02 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ<br>(癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」<br>療法名:消 食道DOC Weekly+Rad<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | | | | 【２番目】 | | | | | |
| 03 | 点滴 | 5%大塚糖液250ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>療法名:消 食道DOC Weekly+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0.5V | | | | 【３番目】 | | | | | |
| | ＜次ページあり＞ | | | | | | | | | | | |

消内　**レジメン名称**：消 食道DOC Weekly+Rad　**インターバル日数**：40 日 **基準日**：Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day28 | Day29 | Day30 | Day31 | Day32 | Day33 | Day34 | Day35 | Day36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 点滴 | 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>療法名:消 食道DOC Weekly+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 5分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0.5V | | 【１番目】 | | | | | | | 【１番目】 |
| 02 | 点滴抗癌剤 | 5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ<br>(癌)(毒)ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ｹﾐﾌｧ」<br>療法名:消 食道DOC Weekly+Rad<br>点滴抗癌剤【薬剤部混合】:<br>＊点滴時間 60分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0mg | | 【２番目】 | | | | | | | 【２番目】 |
| 03 | 点滴 | 5%大塚糖液250ml<br>デキサート注射液(6.6mg)2mL<br>療法名:消 食道DOC Weekly+Rad<br>点滴:<br>＊点滴時間 30分で<br>投与経路:主管より | 1本<br>0.5V | | 【３番目】 | | | | | | | 【３番目】 |