

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)アービタックス注(100mg)20ml	250mg/m2	300mg/m2
06	点滴	(癌)レボホリナート点滴静注用「ヤルト」	200mg/m2	240mg/m2
07	点滴抗癌剤	(癌)イリノテカン塩酸塩注「タイホ」	150mg/m2	190mg/m2
08	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	400mg/m2	480mg/m2
10	バルン型持続注入	(癌)フルオロウラシル注	2400mg/m2	2520mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml ファモチジン注用20mg「トーワ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 療法名:消 大腸FOLFIRI (q2W)+Cet (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V 1A	【1番目】							【1番目】
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 大腸FOLFIRI (q2W)+Cet (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【2番目】							【2番目】
03	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバック (癌)アービタックス注(100mg)20ml 療法名:消 大腸FOLFIRI (q2W)+Cet (Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【3番目】							【3番目】
04	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 大腸FOLFIRI (q2W)+Cet (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【4番目】							
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml アロキン注0.75mg 療法名:消 大腸FOLFIRI (q2W)+Cet (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で <次ページあり>	1本 1A	【5番目】							

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
		投与経路:主管より										
06	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ヤルト」 療法名:消 大腸FOLFIRI (q2W)+Cet (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 120分で 投与経路:側管より	1本 0mg	【6番目】								
07	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)イリノテカン塩酸塩注「タイホ」 療法名:消 大腸FOLFIRI (q2W)+Cet (Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 120分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【7番目】								
08	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 大腸FOLFIRI (q2W)+Cet (Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【8番目】								
09	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:消 大腸FOLFIRI (q2W)+Cet (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【9番目】								
10	バルン型持続注入	生食溶解液キットH 50ml (癌)フルオロウラシル注 パリンナトリウム注N (5000U) 5ml 療法名:消 大腸FOLFIRI (q2W)+Cet (Weekly) 2~ バルン型持続注入【薬剤部混合】: *点滴時間 46時間で 投与経路:主管より : 注入器具バクスターインフューザー(2ml)	1本 0mg 2ml	10番目								
11	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 大腸FOLFIRI (q2W)+Cet (Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本								【4番目】	