泌尿　**レジメン名称**：泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W　**インターバル日数**：19 日　**基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	20mg/m2	21mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)エトポシド点滴注(100mg)5mL「ｻﾝﾄﾞ	100mg/m2	105mg/m2
05	点滴抗癌剤	(癌)ブレオ注15mg	30mg	30mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩注射液 (0.3mg)2mL 「EMEC」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 1A 1V 1本	【１番目】	【１番目】	【１番目】	【１番目】	【１番目】				
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本								【１番目】	
03	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	500ml 0mg	【２番目】	【２番目】	【２番目】	【２番目】	【２番目】				
04	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)エトポシド点滴注(100mg)5mL「ｻﾝﾄﾞ 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	500ml 0mg	【３番目】	【３番目】	【３番目】	【３番目】	【３番目】				
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)ブレオ注15mg 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】							【２番目】	
	＜次ページあり＞											

泌尿　**レジメン名称**：泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W　**インターバル日数**：19 日　**基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
06	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【５番目】							【３番目】	
07	点滴	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本		【４番目】	【４番目】	【４番目】	【４番目】				
	＜次ページあり＞											

泌尿　**レジメン名称**：泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩注射液 (0.3mg)2mL 「EMEC」 デキサート注射液(6.6mg)2mL 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 1A 1V 1本									
02	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【１番目】			
03	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	500ml 0mg									
04	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)エトポシド点滴注(100mg)5mL「ｻﾝﾄﾞ 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	500ml 0mg									
05	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)ブレオ注15mg 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【２番目】			
06	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本						【３番目】			
07	点滴 ＜次ページあり＞	生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) 療法名:泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W	1本									

泌尿　**レジメン名称**：泌 胚細胞（入）BLM+ETP＋CDDP[BEP]q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
		点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より										