

## 使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)フルダラ注50mg	25mg/m2	26.3mg/m2
03	点滴抗癌剤	(癌)(毒)ノバントロン注(10mg)5ml	8mg/m2	8.4mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	200mg/m2	210mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3							
01	点滴	グラセトン点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血リンパ腫 Fludarabine+MIT+CPA[FCM]q4W 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1袋 0.5V	【1番目】	【1番目】	【1番目】							
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)フルダラ注50mg 注射用水20ml 療法名:血リンパ腫 Fludarabine+MIT+CPA[FCM]q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A	【2番目】	【2番目】	【2番目】							
03	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)ノバントロン注(10mg)5ml 療法名:血リンパ腫 Fludarabine+MIT+CPA[FCM]q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【3番目】									
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)エンドキサン注射用 療法名:血リンパ腫 Fludarabine+MIT+CPA[FCM]q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【4番目】	【3番目】	【3番目】							
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:血リンパ腫 Fludarabine+MIT+CPA[FCM]q4W 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【5番目】	【4番目】	【4番目】							