

## 使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌) オンコビン注1mg	1.5mg/m2	2mg
05	点滴	(癌) ウロミテキサン注	240mg/m2	252mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌) エンドキサン注射用	600mg/m2	630mg/m2
09	点滴抗癌剤	(癌) ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg	18.75mg/m2	20mg/m2
10	点滴抗癌剤	(癌) ドキソルピシン塩酸塩注射用10mg	18.75mg/m2	20mg/m2
11	点滴	(癌) ウロミテキサン注	240mg/m2	252mg/m2
13	点滴	(癌) ウロミテキサン注	240mg/m2	252mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml アロキシ注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:腫 軟部VOC-IE:wVDC 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1.5V	【1番目】								
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:腫 軟部VOC-IE:wVDC 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本								【1番目】	
03	点滴抗癌剤	生食溶解液キットH 50ml (癌) オンコビン注1mg 療法名:腫 軟部VOC-IE:wVDC 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【2番目】							【2番目】	
04	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:腫 軟部VOC-IE:wVDC 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【3番目】							【3番目】	
05	点滴  <次ページあり>	大塚生食注2ポート100mL (癌) ウロミテキサン注 療法名:腫 軟部VOC-IE:wVDC 点滴:	1本 0mg	【4番目】	【1番目】							

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
		*点滴時間 30分で 投与経路:主管より										
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlソフトバック (癌)エンドキサン注射用 療法名:腫 軟部VOC-IE:wVDC 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【5番目】	【2番目】							
07	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:腫 軟部VOC-IE:wVDC 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【6番目】	【3番目】							
08	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:腫 軟部VOC-IE:wVDC 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【7番目】	【4番目】							
09	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバック (癌)ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg 療法名:腫 軟部VOC-IE:wVDC 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 2時間で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【8番目】	【5番目】							
10	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ソフトバック (癌)ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg 療法名:腫 軟部VOC-IE:wVDC 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 2時間で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【9番目】	【6番目】							
11	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)ウロミテキサン注 療法名:腫 軟部VOC-IE:wVDC 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	1 0 番目	【7番目】							
12	点滴 <次ページあり>	ソルデム3A (1000m l) 7%炭酸水素ナトリウム注20ml(ジェータミン)	1本 2A	1 1 番目	【8番目】							





