血液　**レジメン名称**：血 骨髄腫(入) MEL200　**インターバル日数**：2 日　**基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)(毒)アルケラン静注50mg	100mg/m2	120mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2							
01	点滴	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ3mg/100mL 療法名:血 骨髄腫(入) MEL200 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1袋	【１番目】	【１番目】							
02	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL (癌)(毒)アルケラン静注50mg 療法名:血 骨髄腫(入) MEL200 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】	【２番目】							
03	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:血 骨髄腫(入) MEL200 点滴: ＊点滴時間 8時間で 投与経路:主管より	1本	【３番目】	【３番目】							
04	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:血 骨髄腫(入) MEL200 点滴: ＊点滴時間 8時間で 投与経路:主管より	1本	【４番目】	【４番目】							
05	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:血 骨髄腫(入) MEL200 点滴: ＊点滴時間 8時間で 投与経路:主管より	1本	【５番目】	【５番目】							