消内　**レジメン名称**：消 胃Ramucirumab (q2W)　**インターバル日数**：12 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	8.4mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	ポララミン注(5mg)1mL ファモチジン注用20mg「トーワ」 生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 胃Ramucirumab (q2W) 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1A 1A 1本	【１番目】								
02	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:消 胃Ramucirumab (q2W) 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	(癌)サイラムザ点滴静注液 生理食塩液250ml(ﾃﾙﾓ) 療法名:消 胃Ramucirumab (q2W) 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【３番目】								
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 胃Ramucirumab (q2W) 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】								