泌尿　**レジメン名称**：泌 尿路上皮CDDP30(Weekly)+Rad　**インターバル日数**：5 日　**基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	30mg/m2	32mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ デキサート注射液(6.6mg)2mL ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩注射液 (0.3mg)2mL 「EMEC」 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:泌 尿路上皮CDDP30(Weekly)+Rad 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 1V 1A 1本	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:泌 尿路上皮CDDP30(Weekly)+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【２番目】								
03	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:泌 尿路上皮CDDP30(Weekly)+Rad 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								