消内　**レジメン名称**：消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI]　**インターバル日数**：54 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴	(癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」	125mg/m2	132mg/m2
03	点滴抗癌剤	(癌)フルオロウラシル注	500mg/m2	525mg/m2
05	点滴	(癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」	125mg/m2	132mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V	【１番目】							【１番目】	
02	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】							【２番目】	
03	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【３番目】							【３番目】	
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】							【４番目】	
05	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【５番目】							【５番目】	
	＜次ページあり＞											

消内　**レジメン名称**：消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI]　**インターバル日数**：54 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V						【１番目】			
02	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【２番目】			
03	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【３番目】			
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本						【４番目】			
05	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg						【５番目】			
	＜次ページあり＞											

消内　**レジメン名称**：消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI]　**インターバル日数**：54 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day19	Day20	Day21	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V				【１番目】					
02	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【２番目】					
03	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【３番目】					
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本				【４番目】					
05	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg				【５番目】					
	＜次ページあり＞											

消内　**レジメン名称**：消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI]　**インターバル日数**：54 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day28	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33	Day34	Day35	Day36
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1V		【１番目】							【１番目】
02	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg		【２番目】							【２番目】
03	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)フルオロウラシル注 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg		【３番目】							【３番目】
04	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本		【４番目】							【４番目】
05	点滴	5%大塚糖液250ml (癌)レボホリナート点滴静注用「ﾔｸﾙﾄ」 療法名:消 大腸 5-FU+LV 6W2R[RPMI] 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg		【５番目】							【５番目】