 期間 : Day1～Day2

血液 **レジメン名称** : 血 ﾘﾝﾊﾟ腫Bendamustine q4W **インターバル日数** : 26 日 **基準日** : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)トレアキシン注100mg	120mg/m2	144mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2							
01	点滴	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注バッグ3mg/100mL デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:血 ﾘﾝﾊﾟ腫Bendamustine q4W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1袋 0.5V	【１番目】	【１番目】							
02	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ 注射用水20ml (癌)トレアキシン注100mg 療法名:血 ﾘﾝﾊﾟ腫Bendamustine q4W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 4A 0mg	【２番目】	【２番目】							
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:血 ﾘﾝﾊﾟ腫Bendamustine q4W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【３番目】	【３番目】							