乳腺　**レジメン名称**：乳 乳腺ADM+CPA[AC] q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg	60mg/m2	63mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	600mg/m2	630mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg 療法名:乳 乳腺ADM+CPA[AC] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1.5V 1A	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	(癌)ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg 大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺ADM+CPA[AC] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	0mg 1本	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺ADM+CPA[AC] q3W 点滴: ＊点滴時間 15分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)エンドキサン注射用 療法名:乳 乳腺ADM+CPA[AC] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【４番目】								
05	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:乳 乳腺ADM+CPA[AC] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【５番目】								