産婦　**レジメン名称**：婦 頚部CDDP40short(Weekly)+Rad　**インターバル日数**：5 日　**基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」	40mg/m2	42mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	ソルデム３A輸液500ml デキサート注射液(6.6mg)2mL アロキシ注0.75mg 硫酸Ｍｇ補正液(20mEq)20ml 療法名:婦 頚部CDDP40short(Weekly)+Rad 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 1.5V 1A 1本	【１番目】								
02	点滴	20%マンニットール注射液 300mL 療法名:婦 頚部CDDP40short(Weekly)+Rad 点滴: ＊点滴時間 35分で 投与経路:主管より	1本	【２番目】								
03	点滴抗癌剤	大塚生食注 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ (癌)シスプラチン点滴静注「ﾏﾙｺ」 療法名:婦 頚部CDDP40short(Weekly)+Rad 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1袋 0mg	【３番目】								
04	点滴	ソルデム３A輸液500ml 療法名:婦 頚部CDDP40short(Weekly)+Rad 点滴: ＊点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本	【４番目】								