

## 使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
04	点滴抗癌剤	(癌)パクリタキセルNK	80mg/m2	96mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」	2mg/kg	2.4mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day9
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml ファモチジン注用20mg「トーワ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 療法名:乳 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V 1A	【1番目】							【1番目】	
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本									
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本	【2番目】							【2番目】	
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルNK 療法名:乳 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【3番目】							【3番目】	
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本	【4番目】							【4番目】	
06	点滴抗癌剤  <次ページあり>	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml	1本 0mg 1A	【5番目】							【5番目】	



RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14	Day15			
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml ファモチジン注用20mg 「トーワ」 デキサート注射液(6.6mg)2mL ポララミン注(5mg)1mL 療法名:乳 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1V 1A									
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本							【1番目】		
03	点滴	大塚生食注2ポート100mL 療法名:乳 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本									
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml (癌)パクリタキセルNK 療法名:乳 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 60分で 投与経路:主管より	1本 0mg									
05	点滴	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴: *点滴時間 10分で 投与経路:主管より	1本									
06	点滴抗癌剤	生理食塩液250ml(テルモ) (癌)トラスツズマブBS点滴静注用「NK」 注射用水20ml 療法名:乳 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~ 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: *点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg 1A							【2番目】		
07	点滴 <次ページあり>	生食溶解液キットH 50ml 療法名:乳 乳腺PTX(2W1R)+HCPT(Weekly) 2~	1本							【3番目】		

