Page:1/2 期間:Day1~Day8 泌尿 レジメン名称:泌 尿路上皮GEM(2W1R)+CBDCA(q3W)

インターバル日数:19 日 **基準日**:Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	楽剤名称	標準値	上限値
03	点滴抗癌剤	(癌)ゲムシタビン点滴静注「ヤクルト」	1000 mg/m2	1050 mg/m2
04	点滴抗癌剤	(癌)カルボプラチンNK注	5 (AUC)	5.3 (AUC)

	T	I was a second	T						1	1		
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
01	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本	【1番目】								
		デキサート注射液(6.6mg)2mL	1V									
		アロキシ注0.75mg	1A									
		療法名:泌 尿路上皮GEM(2W1R)+CBDCA(q3W)										
		点滴:										
		*点滴時間 5分で										
		投与経路:主管より										
02	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本								【1番目】	
		デキサート注射液(6.6mg)2mL	1V									
		療法名:泌 尿路上皮GEM(2W1R)+CBDCA(q3W)										
		点滴:										
		* 点滴時間 5分で										
		投与経路:主管より										
03	点滴抗癌剤	大塚生食注2ポート100mL	1本	【2番目】							【2番目】	
		(癌)ゲムシタビン点滴静注「ヤクルト」	Omg									
		療法名:泌 尿路上皮GEM(2W1R)+CBDCA(q3W)										
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】:										
		*点滴時間 30分で										
		投与経路:主管より										
04	点滴抗癌剤	5%大塚糖液250ml	1本	【3番目】								
		(癌)カルボプラチンNK注	Omg									
		療法名:泌 尿路上皮GEM(2W1R)+CBDCA(q3W)										
		点滴抗癌剤【薬剤部混合】:										
		*点滴時間 60分で										
		投与経路:主管より										
05	点滴	5%糖液キットH 50mL	1本	【4番目】								
		療法名:泌 尿路上皮GEM(2W1R)+CBDCA(q3W)										
		点滴:										
		*点滴時間 10分で										
		投与経路:主管より										
06	点滴	生食溶解液キットH 50ml	1本								【3番目】	
		療法名:泌 尿路上皮GEM(2W1R)+CBDCA(q3W)										
	<次ページあり>											
1												

Page: 2/2 期間: Day1~Day8 泌尿 レジメン名称: 泌 尿路上皮GEM(2W1R)+CBDCA(q3W)

インターバル日数:19 日 **基準日**:Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	
		点滴:										
		*点滴時間 15分で										
		投与経路:主管より										