腫内　**レジメン名称**：腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値
02	点滴抗癌剤	(癌)オンコビン注1mg	1.5mg/m2	2mg
05	点滴	(癌)ウロミテキサン注	880mg/m2	924mg/m2
06	点滴抗癌剤	(癌)エンドキサン注射用	2200mg/m2	2310mg/m2
08	点滴抗癌剤	(癌)コスメゲン注(0. 5mg)	0.04mg/kg	2.5mg
11	点滴	(癌)ウロミテキサン注	880mg/m2	924mg/m2
13	点滴	(癌)ウロミテキサン注	880mg/m2	924mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
01	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml アロキシ注0.75mg デキサート注射液(6.6mg)2mL 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 1A 1.5V	【１番目】								
02	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)オンコビン注1mg 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本 0mg	【２番目】								
03	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:主管より	1本	【３番目】								
04	点滴	ソルデム３A輸液500ml ７％炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ注20ml(ｼﾞｭｰﾀﾐﾝ) 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴: ＊点滴時間 2時間で 投与経路:主管より	1本 1A	【４番目】								
05	点滴 ＜次ページあり＞	大塚生食注2ポート100mL (癌)ウロミテキサン注 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴:	1本 0mg	【５番目】								

腫内　**レジメン名称**：腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W　**インターバル日数**：19 日 **基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より										
06	点滴抗癌剤	5%大塚糖注500mlｿﾌﾄﾊﾞｯｸ (癌)エンドキサン注射用 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 2時間で 投与経路:主管より	1本 0mg	【６番目】								
07	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴: ＊点滴時間 10分で 投与経路:側管より	1本	【７番目】								
08	点滴抗癌剤	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml (癌)コスメゲン注(0. 5mg) 注射用水20ml 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴抗癌剤【薬剤部混合】: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本 0mg 1A	【８番目】								
09	点滴	生食溶解液ｷｯﾄH 50ml 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴: ＊点滴時間 5分で 投与経路:側管より	1本	【９番目】								
10	点滴	ソルデム3A（1000ｍｌ） ７%炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ注20ml(ｼﾞｭｰﾀﾐﾝ) 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:主管より	1本 2A	１０番目								
11	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)ウロミテキサン注 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	１１番目								
12	点滴 ＜次ページあり＞	ソルデム3A（1000ｍｌ）	1本	１２番目								

腫内　**レジメン名称**：腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W　**インターバル日数**：19 日　**基準日**：Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1								
		７％炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ注20ml(ｼﾞｭｰﾀﾐﾝ) 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:主管より	2A									
13	点滴	大塚生食注2ポート100mL (癌)ウロミテキサン注 療法名:腫 軟部（入）VCR+ACD+CPA[VAC] q3W 点滴: ＊点滴時間 30分で 投与経路:主管より	1本 0mg	１３番目								